

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Allergietest met priktest

Video voice-over

#Allergie test

Tijdens een allergietest wordt er een stukje tape op uw onderarm geplakt met daarop een aantal getallen. Vervolgens worden er langs een aantal stoffen op uw onderarm gedruppeld. In de huid onder het druppeltje wordt vervolgens geprikt.

Daarna worden de druppels geabsorbeerd met een doekje en moeten de stoffen 15 minuten inwerken.

Als u allergisch bent voor een of meerdere stoffen kan het zijn dat het blaasje wordt gemeten of wordt omlijnd.

Gewoonlijk duurt het onderzoek 30 minuten

Met dit onderzoek wordt gekeken of u overgevoelig bent voor bepaalde stoffen (allergenen) die u eet of inademt. De allergietest wordt op de huid van uw onderarm uitgevoerd met behulp van prikjes. Er wordt getest op verschillende allergenen zoals huisstofmijt en pollen.

Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

Stoppen met medicijnen?

Is het onderzoek aangevraagd door de dermatoloog?



- Stop 3 dagen van tevoren met het gebruik van anti-allergische medicijnen (antihistaminica).
- Stop 3 dagen van tevoren met het gebruik van hormoonzalven op uw onderarmen. Ook tacrolimus (Protopic) of pimecrolimus (Elidel) dienen gestopt te worden.

Is het onderzoek aangevraagd door de longarts?

Kijk op de medicatiestoplijst of u tijdelijk het gebruik van uw medicijnen moet stoppen. Deze lijst krijgt u bij het maken van de afspraak.

Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:

- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen).
- De pas van uw ziektekostenverzekering.
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort).
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt in sommige ziekenhuizen ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.