


Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Shuntbepaling



Slide 1

Met een shuntbepaling wordt het zuurstofgehalte in uw longen gemeten via uw bloed.




Slide 2

De zorgverlener vraagt u te gaan zitten of liggen, volg hierbij de instructies op.



Slide 3

U krijgt een knijper op uw neus en doet uw mond om het mondstuk. Vervolgens zult u via het apparaat rustig moeten in- en uit ademen.




Slide 4

U krijgt via het apparaat 100% zuurstof toegediend. U ademt zo meer zuurstof in dan via gewone lucht.

INDIVEO


Slide 5



Om het zuurstofgehalte te meten in uw bloed, wordt er bloed uit de slagader afgenomen.

INDIVEO

Slide 6



Het aanprikken van de slagader kan even pijn doen.

INDIVEO

Slide 7



Hierna is het onderzoek klaar.



Het onderzoek duurt gemiddeld 30 tot 45 minuten

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Uw voorbereiding



- Draag niet-knellende bovenkleding.
- Geen zware inspanning voor het onderzoek. 1 uur voor het onderzoek niet sporten of andere lichamelijke inspanning verrichten.
- Niet roken. U mag 1 uur voor het onderzoek niet roken, vaperen of waterpijp roken.
- Geen zware maaltijden voor het onderzoek. U mag wel gewoon eten en drinken.
- Geen alcohol of verdovende middelen voor het onderzoek. U mag ten minste 12 uur voor het onderzoek geen alcohol drinken en 8 uur voor het onderzoek geen verdovende middelen gebruiken.

Kleding van katoen



100% zuurstof is erg brandbaar. In verband met brandveiligheid moet u kleding van katoen aantrekken. Bijvoorbeeld een katoenen T-shirt en een spijkerbroek.



Gebruik geen vette stoffen op uw huid

Vanwege brandveiligheid mag u voor dit onderzoek geen gebruik maken van vette stoffen op uw huid. (Bijvoorbeeld bodylotion, lippenstift, zalf of vaseline.)

Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te nemen.

Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:



- Uw afsprakenbrief (als u die heeft gekregen).
- De pas van uw ziektekostenverzekering.
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort).
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt in sommige ziekenhuizen ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.

Nazorg

Bekijk hier uw nazorg en lees over mogelijke risico's en complicaties.

Drukverband



Na het onderzoek krijgt u een drukverband. Dit drukverband moet 2 uur blijven zitten. **Let op! Gebruikt u bloedverdunners? Dan moet het drukverband 4 uur blijven zitten.**

Hierna mag u het verband thuis zelf verwijderen.

De uitslag van het onderzoek



Na het onderzoek bespreekt uw arts de uitslag met u.

Geen risico's




Dit onderzoek kent geen risico's.

Verdiepende informatie

Meer informatie over uw onderzoek of behandeling

Abnormale verbinding in de bloedvaten



Bij dit onderzoek wordt bepaald of er een abnormale verbinding in de longbloedvaten bestaat, waardoor zuurstofarm bloed zich vermengt met zuurstofrijk bloed.