

Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

Cystoscopie

Video voice-over

***Cystoscopie, een kijkonderzoek in de blaas.** Om het onderzoek goed te laten verlopen moet uw blaas leeg zijn. Ga daarom voor het onderzoek naar het toilet. U wordt door een medewerker opgehaald uit de wachtkamer. De medewerker vraagt u om uw onderkleding uit te doen, u mag uw sokken aanhouden. Vervolgens neemt u plaats in een speciale stoel waarbij uw benen omhoog en uit elkaar gaan. Uw benen komen op de steunen te liggen.*

De huid rond uw plasbuis wordt schoongemaakt, dit kan even koud aanvoelen. Op de tip van de scoop zit een glijmiddel met daarin een verdoving. Het inbrengen van de scoop in de plasbuis kan ongemakkelijk voelen. Via de scoop wordt er een spoelvloeistof in uw blaas gespoten, hierdoor kan de arts uw blaas beter bekijken. Door de vloeistof krijgt u aandrang om te plassen.

De arts bekijkt met de scoop uw blaas en plasbuis. In de meeste gevallen kunt u zelf meekijken. Als de arts voldoende heeft gezien wordt de scoop er rustig uitgehaald en mag u zich aankleden. Na het onderzoek krijgt u het advies om de vloeistof uit te plassen en extra water te drinken. Hierna volgt meestal een korte nabespreking.

Een cystoscopie is een kijk onderzoek waarbij er met een kleine camera gekeken wordt naar de binnenkant van uw blaas. Bij mannen wordt er ook naar de plasbuis en het prostaatgebied gekeken.



Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.

Voor dit onderzoek is geen specifieke voorbereiding nodig



Vergeet niet mee te nemen:

- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen)
- De pas van uw ziektekostenverzekering
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort)
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.

Medicijnen



Misschien heeft u voor het onderzoek een korte kuur met medicijnen nodig. Als dit bij u zo is, bespreekt de uroloog dit met u.

Nazorg na uw onderzoek

De uitslag van het onderzoek



Na het onderzoek bespreekt uw arts de uitslag met u.

Naar huis



Na het onderzoek mag u direct naar huis en mag u zelf autorijden.

Een branderig gevoel bij het plassen



Na het onderzoek kunt u een branderig gevoel bij het plassen hebben of het gevoel hebben dat u vaak naar de wc moet. Dit is normaal. Dit gevoel verdwijnt vanzelf maar kan een paar dagen aanhouden.

Bloed bij de urine



Na het onderzoek kan er wat bloed bij de urine zitten. Dit kan na een uur over zijn of pas na twee dagen. Dit zijn normale klachten. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken.

Goed drinken na het onderzoek



Het is verstandig om goed te drinken na het onderzoek. Zo worden de blaas en plasbuis schoongespoeld en zal het brandigere gevoel en het bloed bij de urine sneller weg zijn.

Risico's

Mogelijke risico's tijdens en na uw onderzoek of behandeling.

Weinig risico's



Een cystoscopie heeft weinig risico's. Soms ontstaat er na het onderzoek een ontsteking of licht bloedverlies. Neem contact met ons op als:

- Klachten zoals branderigheid en bloed bij de urine langer dan twee dagen duren
- Er steeds meer bloed meekomt met de urine
- U veel pijn heeft na het onderzoek
- U koorts krijgt (boven 38,5 graden Celsius)
- Het plassen moeilijker wordt