

Slikonderzoek na bariatrische chirurgie

Röntgenonderzoek van maag en slokdarm

U komt binnenkort naar de afdeling radiologie van het MCL voor een onderzoek van uw slokdarm en/of maag. Uw behandelend arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek nodig is. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt. Heeft u na het lezen nog vragen, stel die dan gerust aan uw arts of aan de laborant. U kunt de afdeling radiologie telefonisch bereiken op werkdagen van 8.00 – 16.30 uur. Het telefoonnummer vindt u op de achterzijde van deze folder.

Wilt u als u verhinderd bent, niet vergeten ons te bellen? Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Slikonderzoek

Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van de slokdarm en/of maag met behulp van röntgenstralen. Het onderzoek kan ook gedaan worden om uw slikfunctie te onderzoeken. Het röntgenapparaat is aangesloten op een monitor, waarop het röntgenbeeld is te zien. Om alles goed in beeld te brengen moet u een contrastmiddel opdrinken. Dit contrastmiddel is bariumpap (een melkachtige vloeistof).

Het is ook mogelijk dat u geen bariumpap, maar een waterig contrastmiddel te drinken krijgt of dat u brood mee moet nemen, zodat de specialist kan onderzoeken hoe de passage is met vast voedsel. Dit is afhankelijk van uw klachten en wordt in de meeste gevallen vooraf met u besproken.

Vorbereiding

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat u nuchter bent. Dat betekent dat u 3 uren vóór het onderzoek niets meer mag eten en drinken. U mag daarvoor nog een licht ontbijt/lunch nemen, bijvoorbeeld een beschuit met jam en een kopje thee zonder suiker. U kunt misschien iets te eten meenemen voor na het onderzoek.

Gang van zaken

Tien minuten vóór de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie. U wacht in de wachtkamer tot u aan de beurt bent. De laborant haalt u op en brengt u naar het kleedkamertje. De laborant vertelt u welke kledingstukken u aan kunt houden. Ook vertelt de laborant u de verdere gang van zaken.

U komt in de onderzoekkamer, waar u op de onderzoekstafel plaatsneemt. De laborant, radioloog of specialist zet de onderzoekstafel in verschillende standen. Soms horizontaal soms verticaal. Ook moet u zelf steeds van houding veranderen. De laborant of radioloog vertelt wanneer u het contrastmiddel moet drinken.

Op deze manier maakt de radioloog of specialist van alle delen van uw maag en/of slokdarm röntgenfoto's.

Hierna gaat u van de onderzoekstafel af en kleedt u zich weer aan. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

Aanpassing maagband

Indien van toepassing: afhankelijk van de passage, die te zien is op de slikfoto, kan het zijn dat uw maagband strakker of losser gezet wordt. De verpleegkundig specialist of specialist kan ter plekke uw maagband aanprikken.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Omdat bariumpap een witte vloeistof is, kan dit uw ontlasting wit kleuren.

De uitslag van het onderzoek

Als de specialist bij het onderzoek aanwezig is, wordt de uitslag gelijk met u besproken. Als de specialist niet aanwezig is, krijgt u de uitslag van uw specialist op de polikliniek. Meestal heeft deze de uitslag binnen een week na het onderzoek.

Risico's

Röntgenfoto's worden met behulp van röntgenstralen gemaakt. De röntgenstralen gaan door uw lichaam heen zonder dat u daar iets van merkt. Blootstelling aan röntgenstralen kan schadelijk zijn. Daarom wordt er zorgvuldig op gelet dat u zo weinig mogelijk straling krijgt.

Straling kan ook gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn dient u dit van tevoren te melden aan uw behandelend arts of aan de laborant.

www.mcl.nl

Afdeling radiologie
Centrum Obesitas Noord Nederland

058 - 286 35 35
058 - 286 69 69

©MCL november 2023

Docnr. 31415 (6)