

Behandeling van een cyste met alcoholinjectie

Sclerosering cyste

U komt binnenkort naar de afdeling radiologie voor een behandeling van een cyste. Deze behandeling vindt plaats op de angiokamer. Uw arts heeft met u besproken waarom u deze behandeling krijgt. Alle afspraken die nodig zijn voor deze behandeling krijgt u via uw arts. Deze folder is bedoeld om u alvast over de behandeling te informeren.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel die dan gerust aan uw arts of aan de laborant. De afdeling radiologie is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. Het telefoonnummer staat onderaan de folder.

Wat is een cyste

Een cyste is een holte met vocht. Cysten komen vrij regelmatig voor en in verschillende delen van het lichaam. De afmeting van de cyste kan verschillen van een paar millimeter tot meer dan 10 cm. Er kan sprake zijn van één of van meerdere cysten. Cysten zijn onschuldig, maar veroorzaken soms klachten.

De behandeling

Het doel van de behandeling is om uw cyste kleiner te maken zodat u geen klachten meer heeft van de cyste. Deze behandeling heet scleroseren. Scleroseren is het verharden of wegbranden van weefsel. Door het inspuiten van alcohol verhardt het weefsel van de cyste. Hierdoor klappt de cyste dicht zodat deze geen vocht meer aanmaakt. Meestal is één behandeling voldoende, maar soms moet de behandeling herhaald worden.

Voorbereiding

Heeft u met uw arts afgesproken dat u onder sedatie wordt behandeld? Dan krijgt u een afspraak bij het PAS (pre anesthesiologisch spreekuur). Tijdens deze afspraak wordt bekeken of de behandeling onder sedatie kan worden uitgevoerd. Sedatie betekent dat u slaapmiddelen krijgt toegediend, zodat u slaapt tijdens de behandeling.

Voorbereidingen voor de behandeling:

- Indien van toepassing: volg de nuchterheidsregels van het PAS.
- Laat sieraden zoveel mogelijk thuis.
- Gebruikt u bloedverdunners? Overleg met uw arts over het gebruik hiervan en of u hiermee moet stoppen.
- Bent u allergisch voor contrastmiddel, meld dit dan aan de laborant en/of arts.

Gang van zaken

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de informatiebalie. Een vrijwilliger brengt u naar het daghospitaal. Vanuit daar gaat u naar de angiokamer voor de behandeling. De behandeling bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1:

In de cyste wordt een slangetje geplaatst, zodat de cyste leeggezogen kan worden. Het plaatsen van dit slangetje gebeurt onder plaatselijke verdoving. De radioloog maakt gebruik van echografie om het slangetje op de juiste plaats te prikken.

Stap 2:

Na het plaatsen van het slangetje wordt bekeken of het slangetje goed in de cyste zit en niet lekt door het slangetje te vullen met contrastmiddel

Stap 3:

Ligt het slangetje op de juiste plaats? De cyste kan nu worden behandeld. Het toedienen van alcohol kan gevoelig zijn, eventueel kan de radioloog extra verdoven. De alcohol moet een aantal minuten (ongeveer 20-30 min) in de cyste blijven om goed zijn werk te kunnen doen. U wordt gevraagd om te draaien, zodat de alcohol goed verdeeld wordt.

Stap 4:

Daarna wordt de cyste weer leeggezogen via het slangetje. Het slangetje wordt verwijderd en op de prikplaats krijgt u een pleister.

Stap 5:

U gaat terug naar het daghospitaal waar u nog 3-4 uur ter observatie blijft. Heeft u sedatie gehad tijdens de behandeling? Dan gaat u eerst naar de uitslaapkamer, voordat u terug gaat naar het daghospitaal.

Na het onderzoek

De plaats waar de cyste gezeten heeft en de aanprikplaats kunnen gevoelig zijn. Heeft u klachten (bijvoorbeeld zwelling, koorts, roodheid etc.)? Neem dan contact op met uw huisarts of uw arts in het ziekenhuis.

Risico's

Röntgenfoto's worden met behulp van röntgenstraling gemaakt. De röntgenstralen gaan door uw lichaam heen zonder dat u daar iets van merkt. Blootstelling aan röntgenstralen kan schadelijk zijn. Wij letten erop dat u zo weinig mogelijk straling krijgt. Straling kan ook gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn moet u dit van tevoren melden aan uw arts of aan de laborant.

De uitslag van het onderzoek

De radioloog bekijkt alle foto's en van het onderzoek wordt een verslag gemaakt. Bij uw controleafspraak bespreekt de arts samen met u het resultaat van de behandeling.