

Technetium schildklier-scan

Wat is een schildklier-scan?

Deze scan helpt om te kijken hoe uw schildklier werkt.

Hoe gaat het onderzoek?

1. **Ontvangst en wachtkamer:** In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
2. **Oproep en injectie:** Een medewerker haalt u op en geeft u een injectie met de speciale vloeistof.
3. **Wachten:** Na de injectie wacht u ongeveer 20 minuten.
4. **Onderzoek:** Doe kleding met metalen onderdelen uit. Doe sieraden af. Daarna gaat u op de onderzoekstafel liggen. Blijf stil liggen tijdens de scan.
5. **De scan:** De scan duurt ongeveer 10 minuten. U voelt niets van de scan.

Uw voorbereiding

- > **Zwanger?** Vertel het aan de medewerkers als u zwanger bent of denkt te zijn.
- > **Eten en drinken:** U mag normaal eten en drinken.
- > **Medicijnen:** Als u medicijnen voor uw schildklier gebruikt, zoals Thyrox en Strumazol of Thiamazol, moet u hier misschien tijdelijk mee stoppen. Uw dokter vertelt u hier meer over. Andere medicijnen kunt u normaal blijven innemen.
- > **Recente onderzoeken:** Heeft u de laatste 3 maanden een onderzoek gehad waarbij u contrastvloeistof kreeg? Vertel dit dan aan ons.
- > **Andere middelen:** Gebruikt u het medicijn Cordarone, homeopathische middelen met jodium, of eet u veel zeewier of kelp? Vertel dit dan aan ons, het kan invloed hebben op het onderzoek.

Wat neemt u mee?

Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Na het onderzoek

- > U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- > Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.

De uitslag van het onderzoek

- > De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- > Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.

Belangrijk om te weten

- > **Borstvoeding:** Na de injectie kunt u 12 uur geen borstvoeding geven. U kunt dan de melk afkolven en bewaren in de koelkast of vriezer. 12 uur na de injectie kunt u weer normaal borstvoeding geven.





- > **Straling:** De vloeistof geeft een beetje straling af, maar dit is heel weinig en veilig. Na een paar uur is het meeste al weg.

