

Bijschildklier-scan

Wat is een bijschildklier-scan?

Deze scan is een speciaal onderzoek om te kijken naar hoe uw bijschildklieren werken.

Hoe gaat het onderzoek?

1. **Ontvangst en wachtkamer:** In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
2. **Oproep en injectie:** Een medewerker haalt u op en geeft u een injectie met de speciale vloeistof.
3. **Wachten:** Na de injectie wacht u ongeveer 10 minuten.
4. **Onderzoek:** Doe kleding met metalen onderdelen uit. Doe sieraden af. Het onderzoek bestaat uit 2 series met scans. U gaat op de onderzoekstafel liggen. Blijf stilliggen tijdens de scan.
5. **De scan:**
 1. Eerste serie: De scan duurt ongeveer 15 minuten. U voelt niets van de scan. U moet wachten voor de tweede serie. Dit mag ook ergens anders in het ziekenhuis.
 2. Tweede serie: Ongeveer 1 uur na de eerste serie. De scan duurt ongeveer 60 minuten. Ook hier voelt u niets van de scan.

Uw voorbereiding

- > **Zwanger?** Vertel het aan de medewerkers als u zwanger bent of denkt te zijn.
- > **Eten en drinken:** U mag normaal eten en drinken.
- > **Medicijnen:** U kunt uw normale medicijnen blijven innemen.

Wat neemt u mee?

- > Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Na het onderzoek

- > U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- > Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.

De uitslag van het onderzoek

- > De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- > Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.

Belangrijk om te weten

- > **Borstvoeding:** Na de injectie kunt u 24 uur geen borstvoeding geven. U kunt dan de melk afkolven en bewaren in de koelkast of vriezer. Na 24 uur kunt u deze melk gebruiken. En mag u ook weer borstvoeding geven.





- > **Straling:** De vloeistof geeft een beetje straling af, maar dit is heel weinig en veilig. Na een paar uur is het meeste al weg.

