

Extravasatie

Contrastvloeistof naast bloedvat gespoten

Zojuist heeft u een onderzoek gehad, waarbij u een injectie met contrastvloeistof heeft gekregen. De contrastvloeistof werd via een infuus in uw arm in de bloedbaan gespoten. Helaas kwam tijdens deze injectie (een deel van) de contrastvloeistof buiten het bloedvat. Dit heet extravasatie. Meestal geeft dit weinig tot geen hinder. Maar soms ontstaat er een harde, pijnlijke zwelling op de plaats waar het infuus gezeten heeft. Uw lichaam voert de contrastvloeistof zelf af. De zwelling verdwijnt dan meestal binnen twee tot vier dagen. Heel soms kunnen de klachten tot een week aanhouden.

Aanpak

De behandeling is al in de onderzoekskamer gestart. De laborant heeft de zwelling met lichte druk gekoeld. Verder krijgt u de volgende adviezen:

- Hoog houden: probeer uw arm hoog te houden als u zit of ligt. Laat uw arm dus zo weinig mogelijk naar beneden hangen. Maak regelmatig knijpbewegingen met uw hand. Dit zorgt voor een betere afvoer van het vocht.
- Pijn verzachten: om de eventuele pijn te verzachten kunt u de zwelling tijdens de eerste 24 uur 1-3 keer per dag (zo'n 30 minuten per keer) koelen met koude kompressen. Deze maakt u zelf eenvoudig door ijsblokjes in een plastic zakje te doen. Wikkel ze in een droge handdoek of droog washandje en houd dit tegen de zwelling. Leg het ijs **niet direct** op de huid. Er zijn ook zogenaamde 'cold packs' verkrijgbaar bij de drogist of bij sportzaken die wat handiger in het gebruik zijn.

Verergering

Er bestaat een kleine kans op ontstekingsverschijnselen rond de plaats van de injectie. Mogelijke klachten zijn:

- Blaarvorming
- Duidelijk toenemende pijnklachten
- Ontsteking, toename van zwelling en roodheid
- Zweervorming/huidschade
- Verminderd gevoel/doofheid van aangedane lichaamsdeel

Heeft u één of meerdere van deze klachten? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Wilt u bij uw bezoek aan de huisarts deze brief meenemen?

Vragen?

U kunt contact opnemen met onze afdeling radiologie via 058-286 3535. Heeft u vragen over het PET/CT-onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

www.mcl.nl

Afdeling radiologie, route 77

058 – 286 35 35

Afdeling nucleaire geneeskunde, route 87

058 – 286 69 19