

Starre endo-echografie

Het onderzoek

Bij een endo-echografie van de anus en/of endeldarm wordt een starre staaf gebruikt met aan het uiteinde een klein echo-apparaat. Dit echo-apparaatje zendt niet-waarneembare geluidsgolven uit. De echo's van deze geluidsgolven worden na weerkaatsing in het lichaam weer opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op de monitor. Doordat de geluidsgolven diep in de weefsels doordringen is het mogelijk om informatie te krijgen over de weefsels die dieper liggen, zoals de kringspieren van de anus.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de endoscopie-afdeling op de eerste etage van het MCL (route 55). De endoscopie-assistente haalt u op uit de wachtkamer en neemt u mee naar de onderzoeksruimte. Indien dit nodig is, krijgt u vooraf een klysma. U gaat op de onderzoekstafel liggen met ontbloot onderlijf.

- Bij een onderzoek van de anus ligt u op uw linkerzij.
- Bij een onderzoek van de endeldarm ligt u op uw linkerzij of op uw rug met de benen in beensteunen.

De maag-darm-leverarts schuift het echoapparaat, dat voorzien is van een beschermend condoom, voorzichtig via de anus een klein stukje in de endeldarm, zodat het gebied rond de anus en de endeldarm geïnspecteerd kan worden. De arts kan tijdens het onderzoek water in de endeldarm spuiten, omdat zo de geluidsgolven beter worden geleid.

Wanneer dit onderzoek wordt verricht in verband met een fistel kan het zijn dat de arts waterstofperoxide gebruikt om de fistel beter af te beelden. Dit kan pijnlijk zijn. In sommige gevallen wordt bij vrouwen een endo-echografie verricht vanuit de vagina.

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en wordt over het algemeen als niet-belastend ervaren.

Uw voorbereiding

- Anale endo-echografie – geen voorbereiding nodig.
- Endo-echografie van de endeldarm – voorafgaand een klysma.

U meldt zich eerder op de afdeling van de endoscopie. De endoscopie-assistente geeft u het klysma via de anus. Het laatste stukje van de darm is dan schoon voor het onderzoek.

Medicijnen

Vertel uw behandeld arts als u 's ochtends medicijnen gebruikt. Het kan zijn dat u tijdelijk hiermee moet stoppen of dat u deze medicatie het beste in kan nemen na het onderzoek. Denk hierbij aan:

- Bloedverdunners, bepaalde bloedverdunners moet u stoppen.
- Medicatie voor suikerziekte.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door uw eigen arts (de arts die het onderzoek heeft aangevraagd) met u besproken.

Mogelijke complicaties

Een endo-echografie is over het algemeen een veilig onderzoek. Complicaties komen gelukkig zelden voor.

- Een zeer zeldzame complicatie is een scheurtje in de anus of de endeldarm. Dit geneest meestal spontaan.
- Als u hevige buikpijn of koorts krijgt, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Overdag kunt u contact opnemen met de afdeling endoscopie van het MCL, zie onderstaand de telefoonnummers. 's Avonds en in het weekend belt u met de dokterswacht.

www.mcl.nl

MCL	058 – 286 66 66
Maag,- darm- en leverziekten	058 – 286 69 50
Chirurgie	058 – 286 61 63
Planning endoscopieafdeling	058 – 286 34 03