

Mesalazine

Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Uw behandelend arts en/of verpleegkundig consulent heeft met u gesproken over het gebruik van mesalazine. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn. Ook kunt u lezen wat u moet doen als u last krijgt van bijwerkingen. Deze folder vervangt de bijsluiter niet. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u daarmee terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundig consulent.

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Daardoor heeft u minder klachten en heeft u minder kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. De huidige medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken, maar kunnen de ziekte niet genezen. Als u de medicijnen afbouwt of ermee stopt, kunnen de klachten dus weer terugkomen.

Werking

Mesalazine wordt gebruikt bij ontstekingen van de dikke darm. Nadat mesalazine is ingenomen, komt het via de maag in de darm terecht. De werkzame stof komt vrij in de dikke darm. De werking treedt geleidelijk in. Mesalazine wordt niet alleen gebruikt om een ontsteking tot rust te brengen, maar ook om nieuwe ontstekingen te voorkomen.

Gebruik

Dosering

Mesalazine is verkrijgbaar in tabletten en is ook als zetpil, klysma en granulaat (korrels) verkrijgbaar. De meest gebruikte dosering is 3 of 4 gram in 1 gift granulaat. Uw behandelend arts kan in bepaalde omstandigheden echter een hogere of lagere dosis voorschrijven.

Wanneer?

Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het beste tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten met water in hun geheel door. Granulaat kunt u met een lepel met vla, yoghurt of kwark innemen.

Bijwerkingen

Mesalazine heeft meestal weinig bijwerkingen. Heeft u echter last van (mogelijke) bijwerkingen, bespreek dit dan altijd met uw behandelend arts of verpleegkundig consulent. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- huiduitslag, jeuk
- misselijkheid
- diarree
- haaruitval
- duizeligheid, hoofdpijn
- stemmingsveranderingen
- nierfunctiestoornis (zeldzaam)

U merkt zelf niets van een nierfunctiestoornis. Daarom wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd.

Zwangerschap, vruchtbaarheid en borstvoeding

Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw. Tijdens de zwangerschap kan mesalazine veilig worden gebruikt. Overleg wel altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt. Mesalazine kan worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. Overleg hierover met uw behandelend arts.

Tot slot

Heeft u problemen en vragen die niet dringend zijn? Bespreek deze dan met uw behandelend arts of verpleegkundig consulent IBD tijdens uw controlebezoek aan de polikliniek.

Als uw vragen niet kunnen wachten tot de volgende controleafspraak, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent IBD. De verpleegkundig consulent IBD is bereikbaar door een bericht te sturen via MijnMCL of mijnIBDcoach. Mocht er telefonisch contact nodig zijn, dan hebben zij een telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 10.30 uur. Buiten de werkdagen en kantoortijden dient u contact te zoeken met uw huisarts of dokterswacht.

Heeft u vragen over het samengaan van mesalazine met uw andere geneesmiddelen? Neem dan contact op met uw apotheek.

Telefoonnummers:

Verpleegkundig consulent IBD	058 – 286 69 61
MDL-secretariaat	058 – 286 69 50

De inhoud van deze folder is gebaseerd op de folder van de NNIC (Nurses Network IBD Care)

www.mcl.nl

Verpleegkundig consulent IBD

058 – 286 69 61

©MCL april 2023

Docnr. 22178 (3)