

Schildwachtklieeronderzoek

Bij mondholletumoren

Wat is een Schildwachtklieeronderzoek?

Deze scan is een speciaal onderzoek om de eerste lymfeklier op te sporen. Bij de operatie wil de chirurg ook de eerste lymfeklier verwijderen die hoort bij de tumor.

Hoe gaat het onderzoek?

1. **Ontvangst en wachtkamer:** In het ziekenhuis meldt u zich eerst aan voor de afspraak. Dit doet u bij de aanmeldzuil op de afdeling. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten.
2. **Oproep en injectie:** De medewerker neemt u mee naar de camera. U gaat op de onderzoekstafel liggen. U krijgt 2 kleine prikken met een speciale vloeistof rondom het litteken in de mond.
3. **Onderzoek:** Hierna wordt de scan gestart. Het onderzoek bestaat uit 2 series met scans. Blijf stil liggen tijdens de scan.
4. **De scan:**
 1. **Eerste serie:** De scan duurt ongeveer 45 minuten. U voelt niets van de scan. U moet wachten voor de tweede serie. Dit mag ook ergens anders in het ziekenhuis.
 2. **Tweede serie:** Ongeveer 2 uur na de eerste serie. De scan duurt ongeveer 45 minuten. Ook hier voelt u niets van de scan.
 3. **Metten en aftekenen:** De plek waar de lymfeklier zit wordt eerst gemeten. Daarna wordt daar een kruisje op uw huid getekend.

Uw voorbereiding

- > **Zwanger?** Vertel het aan de medewerkers als u zwanger bent of denkt te zijn.
- > **Eten en drinken:** U mag normaal eten en drinken.
- > **Medicijnen:** U kunt uw normale medicijnen blijven innemen.
- > **Beharing:** Als de afwijking op uw hoofd zit, wilt u dan uw baardhaar afscheren. Dat is handig voor dit onderzoek en de latere operatie.

Wat neemt u mee?

- > Een geldig identiteitsbewijs (zoals een paspoort of rijbewijs).

Na het onderzoek

- > U kunt gewoon naar huis en autorijden.
- > Drink extra water om de vloeistof sneller uit uw lichaam te krijgen.

De uitslag van het onderzoek

- > De uitslag krijgt u niet meteen. De gemaakte foto's worden bekeken en de uitslag gaat naar uw eigen dokter.
- > Uw dokter bespreekt de uitslag later met u.





Belangrijk om te weten

- > **Borstvoeding:** Na de injectie kunt u 24 uur geen borstvoeding geven. U kunt dan de melk afkolven en bewaren in de koelkast of vriezer. Na 24 uur kunt u deze melk gebruiken. En mag u ook weer borstvoeding geven.
- > **Straling:** De vloeistof geeft een beetje straling af, maar dit is heel weinig en veilig. Na een paar uur is het meeste al weg.

