

Allergietest voor medicijnen bij kinderen

Geneesmiddelenprovocatietest

Wat is een geneesmiddelprovocatie?

Een geneesmiddelprovocatie helpt ons te weten of uw kind allergisch is voor medicijnen. Uw kind krijgt het medicijn onder veilige omstandigheden. Zo zien we hoe uw kind reageert.

Hoe gaat de test?

1. Uw kind krijgt het medicijn in drie stappen. Tussen elke stap wacht u 60 minuten.
2. Na de laatste stap wacht u nog 1 tot 2 uur in het ziekenhuis.
3. Als uw kind een allergische reactie krijgt, stopt de test. Uw kind blijft dan tot de dokter zegt dat het beter gaat.

Wat moet u doen voor de test?

- Geen antihistaminica gebruiken 3 dagen voor de test.
- Stop niet met eczeem of astma medicijnen.
- Op de ochtend van de test mag uw kind normaal ontbijten. Tijdens de test alleen water drinken.
- Neem iets mee dat uw kind lekker vindt voor na de test.

Ziekte of allergische klachten

Als uw kind ziek is of veel last heeft van allergieën, kan de test niet doorgaan. Bel ons dan om te overleggen of de afspraak uitgesteld moet worden.

Als u niet kunt komen

Bel zo snel mogelijk om uw afspraak af te zeggen of te verzetten. Dit helpt ons met de planning en wachttijden.

Heeft u vragen

Voor vragen kunt u bellen met de polikliniek kindergeneeskunde: 058 – 286 3254.