

Allergietest voor voeding bij kinderen

Voedselprovocatietest

Waarom een voedselprovocatietest?

Een voedselprovocatietest helpt ons te begrijpen:

- Of uw kind allergisch reageert op bepaald voedsel.
- Bij welke hoeveelheid voedsel de klachten beginnen.
- Of uw kind een adrenaline auto-injector nodig heeft voor ernstige reacties.

Hoe werkt de test?

- **Tijdsduur:** De test duurt ongeveer 4,5 uur met 8 stappen. Als er een (mogelijke) reactie is, kan het langer duren.
- **Procedure:** We beginnen met een kleine hoeveelheid voedsel en verhogen dit geleidelijk. Uw kind wordt constant nagekeken.
- **Speeltijd:** Tussen de stappen door kan uw kind spelen in onze speelkamer.

Wat gebeurt er bij klachten?

- Als uw kind een reactie heeft, bepaalt de dokter of de test doorgaat of stopt.
- Uw kind blijft na de test tot eventuele klachten duidelijk wegtrekken..

Vorbereiding thuis

- **Ontbijt:** Uw kind mag normaal ontbijten. Zuigelingen kunnen hun normale flesje krijgen.
- **Medicijnen:** Stop 3 dagen voor de test met antihistaminica. Doorgaan met medicijnen voor eczeem of astma.

Wat neemt u mee?

- Neem eigen drinkfles en eventueel speelgoed mee.
- **Voor zuigelingen:** neem een fruit- of groentehap mee om het testvoedsel in te verbergen.
- De arts vertelt u of u ook het voedingsmiddel dat getest moet worden, moet meenemen.
- Schone kleding voor uw kind.

Ziekte of allergische klachten

Als uw kind ziek is of veel last heeft van allergieën, kan de test niet doorgaan. Bel ons dan om te overleggen of de afspraak uitgesteld moet worden.

Als u niet kunt komen

Bel zo snel mogelijk om uw afspraak af te zeggen of te verzetten. Dit helpt ons met de planning en wachttijden.

Heeft u vragen

Voor vragen kunt u bellen met de polikliniek kindergeneeskunde: 058 – 286 3254.

www.mcl.nl

Polikliniek kindergeneeskunde, route 6

©MCL mei 2024

058 – 286 3254

Docnr. 38300 (1)