

Geneesmiddelprovocatie bij kinderen

Belangrijke informatie

- Tijdens de provocatietest kan uw kind begeleid worden door slechts 1 ouder/ verzorger, er kunnen ook geen broertjes/zusjes bij aanwezig zijn.
- 3 dagen voorafgaand aan de test mag uw kind geen antihistaminica gebruiken.
- Bij ziekte of allergische symptomen kan de test mogelijk niet doorgaan, zeg tijdig af of neem bij twijfel contact op.

De provocatietest

Soms wordt er gedacht aan een allergie voor medicatie. De enige test om te weten hoe en waarop uw kind reageert is de provocatietest. Bij deze test geven wij - onder gecontroleerde omstandigheden – het geneesmiddel aan uw kind. Deze test kan aantonen dat uw kind een allergische reactie heeft op bepaalde geneesmiddelen of dat bepaalde geneesmiddelen juist geen klachten veroorzaakt. Het blijkt namelijk in de praktijk dat ouders en soms ook artsen zich gemakkelijk vergissen en geneesmiddel/medicatie onterecht als oorzaak aanwijzen voor de allergie van hun kind. Dit heeft het ongewenste effect dat het kind belangrijke geneesmiddelen in de toekomst niet kan krijgen. Alternatieve geneesmiddelen hebben vaak meer bijwerkingen of zijn minder effectief. Kortom, om duidelijk vast te stellen of een geneesmiddel de allergieklacht(en) veroorzaakt, doen wij deze provocatietest. Tijdens de gehele provocatie is er een kinderarts-allergoloog aanwezig. Voor ieder verdacht geneesmiddel is een aparte provocatie nodig.

Hoe verloopt de provocatietest?

Uw kind krijgt in een aantal stappen (meestal 3) met steeds 60 minuten ertussen een steeds grotere hoeveelheid van het geneesmiddel aangeboden. Na de laatste stap moet u nog 1 tot 2 uur wachten. Als uw kind klachten krijgt, beoordeelt de arts of hij verder gaat met de volgende stap en of uw kind een medicijn moet krijgen. Als er een allergische reactie optreedt, staakt de arts de verdere provocatie en moet uw kind blijven, totdat de arts vindt dat hij/zij voldoende is opgeknapt. Bij forse reacties of twijfel is deze observatietijd nog langer. Wij beginnen met een (soms zeer) kleine hoeveelheid geneesmiddelen die wij als veilig beschouwen. Hierna geven wij op vaste tijden geleidelijk meer van het verdachte geneesmiddel. Iedere keer gaan wij nauwkeurig na of er een klacht optreedt.

De voorbereiding op het onderzoek

Op de ochtend van het onderzoek mag uw kind een normaal ontbijt nemen. Tussen de verschillende stappen van het onderzoek door mag uw kind niet eten of drinken. Water drinken mag wel. Als uw kind een tablet of drankje tegen de allergie gebruikt (zoals Alerius, Xyzal of Zyrtec), dan moet u hiermee drie dagen voor het onderzoek stoppen. Uw kind moet wel doorgaan met de medicijnen die het gebruikt tegen het eczeem of de astma. Zalven, astmapufjes en neussprays mogen gewoon gebruikt worden. Wilt u tevens iets te eten of drinken meenemen wat uw kind graag lust; soms hebben de kinderen trek na afloop van de provocatietest.

Ziekte of allergische klachten

Als uw kind ziek is (bijvoorbeeld forse verkoudheid of diarree) of veel last heeft van eczeem, hooikoorts of astma (gebruik van Salbutamol/ Ventolin/ Airomir), kan de provocatie niet doorgaan. Wij kunnen uw kind dan onvoldoende beoordelen op de vroege verschijnselen van een allergische reactie; dit geeft een groter risico op ernstigere reacties. Dus bij twijfel vragen we u de provocatie tijdig af te zeggen of te bellen voor overleg. Soms is het nodig uw kind eerst te laten beoordelen door de arts om te kunnen besluiten of de provocatietest door kan gaan.

Bent u verhinderd

Mocht u om wat voor reden dan ook zijn verhinderd voor uw afspraak, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven vanwege de tijd en voorbereiding die het onderzoek kost en in verband met de lange wachtlijst.

U kunt bellen met:

- tijdens kantoortijden polikliniek kindergeneeskunde 058-286 3254.
- avond/nacht/weekend via de afdeling kindergeneeskunde 058-286 3336.

Heeft u andere vragen

Neemt u dan contact op met de polikliniek kindergeneeskunde 058-286 3254.