

Voedselallergie bij baby's

FPIAP voor ouders/verzorgers

Wat is FPIAP?

Food Protein-Induced Allergic Proctocolitis (FPIAP) is een ongevaarlijke vorm van voedselallergie die bij baby's voorkomt. Bij FPIAP is er een ontsteking van de laatste delen van de dikke darm. FPIAP ontstaat tijdens de eerste 6 maanden na geboorte, maar meestal in de eerste 4-6 weken na geboorte. De klachten bestaan uit bloedverlies en/of slijm bij de ontlasting, dunnere ontlasting of diarree. Ondanks deze klachten ontwikkelen kinderen zich goed en groeien ze goed.

Oorzaak van FPIAP

De precieze oorzaak is onbekend. Meestal gaat FPIAP vanzelf over voor de leeftijd van 1 jaar. Koemelk is vaak de boosdoener. Soms zijn tarwe, soja of ei de oorzaak.

Hoe weet u dat een baby FPIAP heeft?

Er zijn geen huid- of bloedtesten voor FPIAP. De diagnose wordt gesteld op basis van de klachten die uw kind heeft. Als er veel bloedverlies is bij de ontlasting, wordt soms bloedonderzoek gedaan om te kijken naar een andere oorzaak van de klachten.

Wat is de behandeling van FPIAP?

De behandeling van iedere allergie is het vermijden van het voedingsmiddel waar de klachten door komen.

- **Kunstvoeding:** Vervang koemel