

Sedatiemogelijkheden bij een bronchoscopie

Sedatie (verdooving)

Video voice-over

Sedatie bij bronchoscopie

Wilt u alleen keelverdooving of ook een slaapmiddel? U krijgt binnenkort een Bronchoscopie onderzoek. Om het onderzoek voor u zo prettig mogelijk te laten verlopen, kunt u naast de standaard keelverdooving kiezen voor lichte tot matige of diepe sedatie. In deze animatie leggen we de verschillende sedatievormen uit. Uw keel wordt altijd verdoofd met een verdovingspray. De verdooving zorgt ervoor dat het inbrengen van de slang geen pijn doet.

U maakt het onderzoek bewust mee, waardoor u gespannen kunt zijn.

Het onderzoek duurt 15 minuten tot 30 minuten. Na het onderzoek mag u direct naar huis en mag u zelf autorijden.

Lichte tot matige sedatie

Als u het onderzoek minder bewust wilt meemaken, kunt u kiezen voor lichte tot matige sedatie. Dit wordt een roesje genoemd. Dit gebeurt meestal met het middel Midazolam, dat via een infuus wordt toegediend.

U wordt direct slaperig. Na het onderzoek kunt u zich niet meer goed herinneren wat er precies is gebeurd.

Tijdens het onderzoek zal uw ademhaling, bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Het kan zijn dat u extra zuurstof krijgt. Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht om bij te komen.

Het nadeel van een licht slaapmiddel is dat u tijd nodig heeft om wakker te worden en 24 uur geen auto mag rijden, machines mag bedienen of belangrijke beslissingen mag nemen. Het onderzoek met lichte sedatie duurt 2,5 tot 3,5 uur.

Diepe sedatie

Als u kiest voor diepe sedatie dan wordt meestal het slaapmiddel Propofol gebruikt. U krijgt dit middel via een infuus toegediend. Met dit slaapmiddel maakt u het onderzoek niet bewust mee. U reageert niet meer op vragen van anderen.

Tijdens het onderzoek zal uw ademhaling, bloeddruk en hartslag in de gaten worden gehouden. Het kan zijn dat u extra zuurstof krijgt. Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht om bij te komen.

Het nadeel van een diep slaapmiddel is dat u tijd nodig heeft om wakker te worden. U mag 24 uur geen auto rijden, machines bedienen of belangrijke beslissingen nemen. Het onderzoek met diepe sedatie duurt 2,5 tot 3,5 uur. Bespreek de voor- en nadelen van de verschillende vormen van sedatie met uw arts. Zo kiest u de vorm die het best bij uw situatie past. U weet dan waar u rekening mee kunt houden.

Wat is sedatie?

Bij sedatie wordt uw bewustzijn verlaagd. Dat wil zeggen dat u slaperig wordt en u achteraf misschien niet meer goed kunt herinneren wat er precies gebeurd is.

Met sedatie wordt ook de pijnprikkel onderdrukt. U voelt daardoor u minder of geen pijn. Met sedatie kunt u een onderzoek beter verdragen.

Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.



Voorbereiden op sedatie

Om u goed voor te bereiden op de sedatie is het belangrijk dat uw arts op de hoogte is van uw gezondheid. Schrijf daarom de antwoorden van deze vragen voor uw arts op:

- Welke medicijnen gebruikt u?
- Heeft u allergieën?
- Heeft u diabetes mellitus (suikerziekte)?
- Heeft u eerder problemen gehad met een infuus?
- Zijn er andere zaken/beperkingen waar wij rekening mee moeten houden?

Geef dit door aan uw arts.



Gehoorapparaten mag u inhouden



Draag tijdens sedatie geen contactlenzen of bril

U mag tijdens de sedatie en het onderzoek geen contactlenzen of bril dragen.



Geen nagellak tijdens de sedatie

U mag tijdens de sedatie en het onderzoek geen nagellak dragen.

Eten en drinken

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Eten en drinken voor de sedatie

- Het is belangrijk dat u voor de sedatie nuchter bent. Dit houdt in dat u **6 uur** voor de sedatie niet meer mag eten.
- Tot **2 uur** voor het onderzoek mag u nog heldere dranken drinken (zoals water, appelsap, thee). De laatste 2 uur voor het onderzoek mag u niets meer hebben.

Geen kauwgom voor het onderzoek

Gebruik **24 uur** voor de sedatie geen kauwgom.



Niet roken

U mag tenminste 4 uur voor de sedatie niet roken.



Volg altijd het advies van uw arts

Gelden voor uw onderzoek andere regels? Houdt u zich dan aan de regels van dat onderzoek.

Als u vragen heeft kunt u die stellen aan uw behandelend arts.

Kleding en sieraden

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Geen sieraden, horloge of piercings

U mag tijdens het onderzoek of de behandeling geen sieraden, horloge of piercings dragen. U kunt deze het beste thuis laten.

Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Medicijnen

Bespreek uw medicijngebruik met uw zorgverlener.

Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



Wat neemt u mee?

- Een geldig legitimatiebewijs. Bijvoorbeeld een rijbewijs, id-kaart of paspoort.
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt.
- Comfortabele kleding en reservekleding.
- Telefoonnummer van uw contactpersoon.

Na het onderzoek

Verminderd reactievermogen



Door de sedatie heeft u een verminderd reactievermogen. Dat betekent dat u minder snel reageert dan normaal.

Daarom mag u na het onderzoek met sedatie:

- De rest van de dag niet aan het verkeer deelnemen.
- Geen belangrijke beslissingen nemen of documenten ondertekenen.
- Geen machines bedienen.



Geen alcohol na het onderzoek

Na het onderzoek of de ingreep mag u tenminste **24 uur** geen alcohol drinken.



Dalen van het zuurstofgehalte of uw bloeddruk

Sedatie is over het algemeen veilig, maar er kunnen risico's ontstaan. Zo kan uw zuurstofgehalte of uw bloeddruk tijdens de sedatie dalen.

Wij zullen u daarom tijdens het onderzoek of de ingreep goed in de gaten houden. Ook na het onderzoek zullen wij u nog een uur blijven controleren.

Heeft u nog vragen?

Stel uw vragen vóór het onderzoek of de behandeling aan uw arts of zorgverlener.