

Gebruik van Efudix

Uw arts heeft u Efudix voorgeschreven voor de behandeling van actinische keratose, Morbus Bowen of superficieel basaalcelcarcinoom. Hieronder leest u hoe u Efudix moet gebruiken.

- > Gedurende 4 weken de afgesproken plekje(s) of zones van de huid 2x per dag insmeren.
- > Als de huid binnen 4 weken kapot gaat (o.a. bloeden) dan eerder stoppen (alleen stoppen bij de plek die open is; rest van de plekken gewoon doorbehandelen).
- > Als de huid nog niet stuk is na 4 weken smeren, dan de kuur verlengen naar 5 tot maximaal 6 weken (in totaal).
- > Herstel van de huid na stoppen met Efudix is 1-4 weken; daarna kan er langdurig nog enige roodheid te zien zijn.
- > Bellen bij koorts/koude rillingen en forse roodheid en zwellingen.

Bekijk ook het filmpje over het gebruik van Efudix:

<https://smeerinstructies.nl/werkzame-stof-fluorouracil-5fu/>

Meer informatie

Zonlicht en de huid

<https://nvdv.nl/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/zonlicht-en-de-huid>

Herken huidkanker

<https://nvdv.nl/storage/app/media/Kaart%20herken%20de%20huidkanker.pdf>

