

Behandeling ijzertekort door Ferinject

IJzerinfuus

Uw arts heeft u het medicijn Ferinject® voorgeschreven vanwege een ijzertekort. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en de gang van zaken in het ziekenhuis.

De diagnose van ijzertekort

IJzer is belangrijk voor een goede werking van verschillende functies in uw lichaam. Uw lichaam kan zelf geen ijzer aanmaken, daarom moet u dagelijks genoeg ijzer binnenkrijgen door volwaardige en gevarieerde voeding en door het slikken van de aanbevolen multivitaminen. IJzer komt voor in vlees en vleesproducten, aardappelen, brood en groenten.

Als u via voedsel niet meer voldoende ijzer binnenkrijgt of opneemt, gaat uw lichaam het ijzer dat is opgeslagen in de lever en milt gebruiken. Als die voorraad op is, ontstaat er ijzertekort. De meest voorkomende oorzaak van ijzertekort bij gezonde mensen is bloedverlies, bijvoorbeeld bij een operatie, een ongeluk, een bevalling of bij menstruatie. Maar er zijn veel meer oorzaken. Bij chronische ziekten, zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa of hartfalen, ontstaat ook vaak een ijzertekort.

Na het bloedonderzoek kan er vastgesteld worden of er sprake is van een ijzertekort. Daarbij wordt onder andere naar de volgende bloedwaarden gekeken:

- > HB-gehalte
- > Serum-ferritine

Wanneer is gebleken dat de ijzertabletten geen resultaat hebben, kunt u het advies krijgen hiermee te stoppen. Er wordt dan gekozen voor het toedienen van een ijzerinfuus met het medicijn Ferinject®.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt plaats op het dagbehandelcentrum in het Frisius MC Leeuwarden.

Toediening van Ferinject®

- > Wanneer u zich meldt op het dagbehandelcentrum wordt eerst uw bloeddruk, hartslag en temperatuur gemeten. De verpleegkundige brengt een strakke band aan om uw bovenarm zodat de ader goed zichtbaar wordt en prikt een infuus.
- > Ferinject® is een ijzerhoudende, bruine oplossing die wordt opgelost in een zoutoplossing. De infuuszak wordt met een dun slangetje aan het naaldje bevestigd, zodat de ijzeroplossing in uw ader kan lopen.
- > Het infuus loopt vaak in een 30 minuten in. Soms kan de inlooptijd langer duren, dit hangt onder andere af van uw leeftijd, conditie en of u eerder een reactie heeft gehad op een ander infuus met ijzer.
- > U blijft nadien nog 30 minuten ter observatie (indien nodig)





Mogelijke bijwerkingen

De verpleegkundige houdt u goed in de gaten om te kijken of uw lichaam goed reageert op de toediening. Het kan voorkomen dat er tijdens het toedienen of als u weer thuis bent bijwerkingen optreden. De meest voorkomende bijwerkingen die op kunnen treden tijdens of na het infuus zijn:

- > Hoofdpijn
- > Duizeligheid
- > Misselijkheid
- > Buikpijn
- > Verstopping/diarree
- > Reactie op injectieplaats: branderig en/of pijnlijk gevoel, roodheid, zwelling en een blauwe plek.

Minder dan 1% van de patiënten heeft last van:

- > Prikkelend gevoel in handen en voeten
- > Verandering van smaak
- > Stijfheid
- > Spier/gewrichtspijn
- > Hoge bloeddruk
- > Koorts
- > Koude rillingen
- > Malaise
- > Perifeer oedeem
- > Verkleuring van de huid, ook kan het medicijn buiten het bloedvat komen waardoor de huid verkleurt.

Ernstige bijwerking, die bijna nooit voorkomt:

- > Overgevoeligheidsreactie, hierdoor kan ernstige anafylactische reactie ontstaan. De verpleegkundige stopt het infuus meteen.

Na de behandeling

Na de behandeling is het toegestaan om met het medicijn Ferinject® auto te rijden. Als dit de eerste keer is dat u een infuus met Ferinject® krijgt, houd er dan rekening mee dat u na de behandeling nog een half uur in het ziekenhuis moet blijven. Zo kan er bij eventuele bijwerkingen meteen actie ondernomen worden.

Veiligheid

Mochten een of meerdere van onderstaande situaties op u van toepassing zijn, bespreek dit dan vooraf met uw arts of verpleegkundige:

- > Indien u zwanger bent (of denkt te zijn) of wanneer u nog borstvoeding geeft.
- > Auto-immuunziekte of ontstekingsziekte, zoals reumatoïde artritis.
- > Ernstig astma, eczeem of andere allergieën.
- > Overgevoeligheid voor dit medicijn of wat daarmee vergelijkbaar is.

Hoe gaat het verder?

Drie maanden na het ijzerinfuus willen wij uw bloedwaarden graag controleren. Een labformulier en een belafsprak om de uitslagen te bespreken worden met de afspraakbevestiging meegestuurd. We zouden graag willen dat u het bloed in het Frisius MC





Leeuwarden laat prikken. Indien u niet nabij het Frisius MC Leeuwarden woont, mag dit ook bij een ziekenhuis of prikpost in de buurt. U bent dan zelf verantwoordelijk dat de uitslag bij ons binnenkomt.

Vragen en afmelding

Kunt u niet komen op de ingeplande datum of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het planbureau, 058 - 286 8424 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur en van 14.00 tot 15.00 uur.

