

Endo-Sponge behandeling




Begrijpelijke voorlichting met animatievideo's

Je kijkt naar de papieren versie van digitale voorlichting met animatievideo's. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de voorlichting.

In het kort

Wat is een Endo-Sponge behandeling?



Uw endeldarm is gedeeltelijk of helemaal verwijderd. Er is een holte ontstaan die niet goed wil genezen. Daarom krijgt u een behandeling met een spons in deze (darm)holte. Dit noemen we een Endo-Sponge behandeling.

Vorbereiding


Belangrijk



Nuchter zijn

Voor de verdoving is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. Uw zorgverlener geeft u hierover meer informatie.

Melden in het ziekenhuis



Voor de eerste plaatsing van een Endo-Sponge

Kom 30 minuten voor de scopie naar het ziekenhuis. Zo is er genoeg tijd voor de voorbereiding.

Voor een wissel van de Endo-Sponge

Bij een wissel van de Endo-Sponge vragen we u om 45 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

De behandeling



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

Uw endeldarm is gedeeltelijk of helemaal verwijderd.

Uw dikke darm is daarna aangesloten op uw anus.

Er is een holte ontstaan die niet goed geneest.

In deze holte kan wondvocht blijven zitten, waardoor een ontsteking kan ontstaan.

Om dit te voorkomen krijgt u een spons in deze holte.

Dit noemen we een Endo-Sponge.

De behandeling vindt plaats in een behandelkamer van het ziekenhuis.

U ligt op uw linkerzij.

U krijgt een verdoving via een infuus.

U bent dan ontspannen en voelt minder pijn.

De zorgverlener brengt een flexibele buis met een camera in...
en bekijkt de holte.

Daarna brengt de zorgverlener een buis in.

Via deze buis plaatst de zorgverlener een sponsje in de holte.


Aan de spons zit een slangetje dat uit uw anus naar buiten komt.

De zorgverlener plakt deze vast op uw lichaam.

Via het slangetje gaat het wondvocht naar een vacuüm pot.


Hierdoor blijft de holte schoon en kan deze langzaam genezen.

De Endo-Sponge blijft in uw lichaam zitten en wordt regelmatig vervangen.




Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.



Roesje


Tijdens de behandeling krijgt u een roesje via een infuus. Hierdoor bent u ontspannen en voelt u minder pijn. U kunt bij bewustzijn zijn.



De vacuümpot


De vacuümpot zorgt ervoor dat wondvocht uit de holte wordt afgevoerd. Hierdoor blijft de holte schoon en kan deze langzaam genezen. Het aansluiten van de vacuümpot op de spons kan even pijn doen.

Waar laat ik de vacuümpot?



U kunt de vacuümpot in een tasje meenemen. Kunt u geen tasje dragen, bijvoorbeeld tijdens het slapen? Dan zet u de pot naast u in bed.

Wanneer is de behandeling klaar?



De arts geeft aan wanneer de behandeling klaar is.


Na de behandeling

Uitslaapkamer



Na de behandeling blijft u kort in de uitslaapkamer. Uw zorgverlener houdt u in de gaten. Als het goed met u gaat, mag u naar huis.

Neem iemand mee



U mag de eerste 24 uur na de behandeling niet zelf auto rijden. Neem iemand mee die u na de behandeling naar huis kan rijden.

Naar huis

Neem contact op bij slechte vacuüm op de pot



Het slangetje van de spons is aangesloten op een vacuümpot.

Thuis houdt u in de gaten of het vacuüm op de pot blijft. Dit ziet u aan het blauwe streepje op de pot. Als de blauwe streep onderaan de pot staat, is het vacuüm doorbroken. Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Spons vervangen

De holte in uw darm wordt langzaam een beetje kleiner. Daarom moet de spons regelmatig vervangen worden door een kleinere spons. U komt daarvoor 2 keer per week naar het ziekenhuis. Bekijk hieronder hoe dit gaat.



Animatievideo

Deze tekst hoort bij een animatievideo. Scan de QR-code met de camera van een telefoon, klik op de link en bekijk de video.

Uitgesproken tekst van de video

U krijgt een verdoving via een infuus.

De zorgverlener brengt via het slangetje zout water naar de oude spons.


Zo raakt de spons los.

Daarna trekt de zorgverlener de spons voorzichtig met het slangetje naar buiten.

En plaatst een nieuwe spons op maat.

Pijnstilling

In de animatie staat dat via het slangetje zout water naar de oude spons wordt gebracht. Hier wordt echter pijnstilling mee bedoeld. Dit wordt al tijdens de voorbereiding op de uitslaapkamer gedaan.



Roesje


Ook bij het vervangen van de spons krijgt u een roesje. Zo bent u ontspannen en voelt u minder pijn.

Endoscoop




Bij het vervangen van de spons is er eerst een inspectie van de holte met een endoscoop. Dit is een dun slangetje met een camera. De zorgverlener kan zo zien of er verbetering is in de holte. En of deze kleiner wordt.

Kleinere sponzen



De sponzen die worden ingebracht zijn steeds kleiner.

Loskrijgen van de spons



Bij het verwijderen van de spons kan deze soms vastgegroeid zijn. De zorgverlener moet dan wat kracht zetten door aan de slang te trekken. Door het roesje voelt u minder pijn. U kunt wat druk ervaren.

Leefregels

Belangrijk



Niet deelnemen aan het verkeer

U mag de eerste 24 uur na een roesje niet deelnemen aan het verkeer. Dit is elke keer na het vervangen van de spons ook zo.

Belangrijk



Niet werken


U mag de eerste 24 uur na een roesje niet werken. Dit is elke keer na het vervangen van de spons ook zo.




Douchen

U mag gewoon douchen. Houd de vacuumpot goed vast onder de douche.

Niet zwemmen



U kunt niet zwemmen tot de behandeling klaar is.



Pijnstilling

Bij pijn mag u pijnstilling nemen, zoals paracetamol. Als u veel pijn heeft, kunt u dit bespreken met uw zorgverlener.

Contact opnemen

Contact



Neem contact op met uw arts bij:

- koorts boven de 38°C;
- buikpijn of zwelling;
- problemen met het vacuüm van de pot.