

In het kort


In het kort



U krijgt een buikvetbiopt. De zorgverlener verzamelt vetweefsel. Dat is een groepje cellen uit uw onderbuik. Deze cellen worden onderzocht om te kijken of u amyloïdose heeft. Dat is een ziekte waarbij het lichaam te veel eiwitten aanmaakt. Hier leest u wat u kunt verwachten bij de behandeling. En waar u rekening mee kunt houden.

Vorbereiding

Eten en drinken mag



U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.

Meld gebruik bloedverdunners



Gebruikt u bloedverdunners? U mag deze blijven gebruiken. Meld dit wel aan uw zorgverlener. Zij kunnen er dan rekening mee houden dat u bloedverdunners gebruikt.

Doorgeven allergie voor lidocaïne

Lidocaïne is een verdovingsmiddel. Bent u allergisch voor dit type verdoving? Geef dit aan bij uw zorgverlener. Dan kan de zorgverlener een ander verdovingsmiddel gebruiken.



Neem iemand mee naar uw afspraak



Na de behandeling kan een deel van de onderbuik gevoelig zijn. Het kan daarom prettig zijn dat iemand ander u naar huis kan brengen na uw afspraak. Het is niet verplicht, na de behandeling mag u auto rijden of fietsen.

Buikvetbiopt

Video

Video voice-over

In uw lichaam zitten eiwitten.

Eiwitten zijn bouwstoffen voor het lichaam.

Ze helpen bij het opbouwen van spieren, botten en organen.

Soms maakt het lichaam te veel eiwitten aan.

Er kan dan schade ontstaan aan organen, zoals de longen of de nieren.

U krijgt een buikvetbiopt.

Zo wordt onderzocht of er bij u te veel eiwitten in uw lichaam zitten.

De behandeling vindt plaats in een behandelkamer van het ziekenhuis.

De zorgverlener desinfecteert de huid en prikt aan beide kanten naast de navel om de verdoving te geven.

Daarna gebruikt de zorgverlener een holle naald. Met deze naald prikt de zorgverlener ook aan beide kanten in uw buik.

En zuigt het vetweefsel op.

De zorgverlener dekt de huid af met gaasjes. En plakt het af met tape.


Dan is de behandeling klaar.



Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer een half uur.

Onderzoeken of u amyloïdose heeft



Met een buikvetbiopt kan een zorgverlener vaststellen of u amyloïdose heeft. Dat is een ziekte waarbij het lichaam te veel eiwitten aanmaakt. De eiwitten hopen zich dan op in 1 of meerdere organen. Hierdoor kan schade ontstaan aan organen. Vaak zitten de eiwitten ook in het buikvet. Daarom verzamelt de zorgverlener een beetje buikvet.

Geen pijn, wel druk



Tijdens de behandeling voelt u geen pijn. U kunt wel druk voelen als de behandeling wordt uitgevoerd. Voelt u toch pijn? Zeg dit dan tegen uw zorgverlener.

Lijntjes op buik



Soms zet de zorgverlener lijntjes op uw buik. Zo is duidelijk in welke richting de zorgverlener in uw buik moet prikken.


Na de behandeling



Gaas eraf, pleister op de wond

1 uur na de behandeling mag u het gaas van de wondjes afhalen. En plaats u een schone pleister. Het is goed om de wondjes de eerste uren na de behandeling eerst afgedekt te houden, omdat er vaak druk op de buik komt.

Niet te zwaar belasten



De eerste paar dagen mag u geen zware dingen tillen. U moet de eerste week rustig aan doen. Uw zorgverlener vertelt u hier meer over.

Bijwerkingen



Gevoelige plek

De huid waar u geprikt bent, kan gevoelig zijn. Dit is normaal en gaat vanzelf over.

Blauwe plek



U kunt een grote blauwe plek op uw onderbuik krijgen. De blauwe plek verdwijnt na 1 of 2 weken.

De uitslag

Vetweefselonderzoek



Het vetweefsel dat is verzameld tijdens de buikvetbiopt wordt opgestuurd voor onderzoek.

Uitslag van het onderzoek



Meestal is de uitslag binnen een paar weken bekend. Uw zorgverlener laat u weten wat de uitslag is.