

Pijnbestrijding met een spinale injectie van morfine

U komt binnenkort naar de afdeling pijnbestrijding van het MCL voor een spinale injectie van morfine. Uw pijnspecialist heeft uitgelegd wat deze behandeling inhoudt. In deze folder kunt u de informatie nog eens nalezen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de pijnspecialist of aan de assistente van de afdeling pijnbestrijding.

Wat houdt de behandeling in?

Een spinale injectie is een behandeling waarbij morfine ingespoten wordt in de ruimte waarin ook het ruggenmergvocht zit. Doel van de behandeling is om te zien of u voldoende pijnstilling heeft van de morfine en of u geen bijwerkingen heeft van dit medicijn. Als u gunstig reageert op de morfine, kunt u in aanmerking komen voor plaatsing van een onderhuidse pomp die bijvoorbeeld morfine afgeeft. Voor deze behandeling wordt u opgenomen op een verpleegafdeling.

Vorbereiding

Gebruikt u bloedverdunners? Geef dit dan door aan uw pijnspecialist. Bepaalde bloedverdunners moeten voorafgaand aan de behandeling tijdelijk worden gestopt. De pijnspecialist bepaalt dit.

Gang van zaken tijdens de opname

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de opnamebalie bij de hoofdingang. U wordt naar de verpleegafdeling gebracht waar u wordt opgenomen. Daar heeft u eerst een opnamegesprek met de verpleegkundige. Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in een bed naar de afdeling pijnbestrijding.

De behandeling

Voor de behandeling gaat u in bed naar de behandelkamer. Daar zijn de pijnspecialist en de assistente aanwezig. De injectie kan op twee manieren worden toegediend:

- terwijl u op de rand van een bed zit.
- onder röntgendoorlichting, terwijl u op een smalle tafel op uw buik ligt.

De pijnspecialist brengt de naald in de onderrug in. Als de naald op de juiste plaats zit, krijgt u het medicijn ingespoten. De behandeling duurt ongeveer tien minuten.

Na de behandeling

Als het goed met u gaat, wordt u weer naar de verpleegafdeling gebracht. De volgende ochtend komt de pijnspecialist bij u langs om te beoordelen of u deze dag naar huis mag.

Wanneer is deze behandeling niet mogelijk

Als u zwanger bent, kan deze behandeling niet bij u toegepast worden. Meld daarom altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige als u zwanger bent of dit denkt te zijn. Ook bij koorts kan de behandeling niet doorgaan. U krijgt dan een nieuwe afspraak.

Naar huis

U mag niet zelf naar huis rijden of fietsen. Zorg er daarom voor dat iemand u naar huis kan brengen.

Weer thuis

U kunt last krijgen van napijn als gevolg van de injectie. Deze pijn kan een paar dagen blijven. U kunt hiervoor eventueel een pijnstillert innemen (bijvoorbeeld paracetamol, dosering volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt meestal een pleister geplakt. Deze mag u 's avonds of de volgende dag weghalen. U kunt dan ook weer douchen of in bad. Binnen vijf uur na de behandeling moet u hebben geplast. De verpleegkundigen op de afdeling controleren regelmatig of de blaas goed leeg is.

Mogelijke bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen optreden na de behandeling:

- Tijdelijk wat moeite met plassen. Indien u hier veel last van heeft, kan een pompplaatsing voor u soms geen goede optie zijn.
- Jeuk kan voorkomen na deze behandeling maar duurt meestal slechts een tot twee dagen.
- U kunt suf worden na deze behandeling. Daarom blijft u een nacht ter observatie in het ziekenhuis.
- De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Toch kunnen er hoofdpijn en duizeligheidsklachten optreden. Als de hoofdpijn en/of duizeligheid langer dan twee dagen duurt, neem dan contact met ons op.
- Als er een bloedvatje is geraakt bij het prikken kan een bloeding ontstaan. Dit kan soms wat pijnlijk zijn.

Tot slot

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen? Dan kunt u bellen met de afdeling pijnbestrijding. Dit kan op werkdagen van 8.15 – 16.30 uur.