

## Flapoorcorrectie

Binnenkort ondergaat u of uw kind een flapoorcorrectie in het MCL. Deze folder geeft informatie over de operatie zelf, de voorbereiding en de periode na de operatie.

### Algemeen

Flaporen, of afstaande oren, komen veel voor. Ze zijn meestal het gevolg van een vormafwijking van het kraakbeen van de oorschelp. Flaporen kunnen operatief worden gecorrigeerd. De operatie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Dit is meestal ook de leeftijd waarop een kind op negatieve wijze geconfronteerd wordt met het afwijkende oor en er zich ook bewust van is. Men kan zich ook op latere leeftijd laten opereren.

### Vorbereiding

Meldt de KNO-arts of u medicijnen met een bloedverdunnende werking gebruikt (aspirine, acetylsalicylzuur, sintrommitis, acenocoumarol). U dient het gebruik van deze medicijnen voor de operatie te staken. De KNO-arts vertelt u hoe lang van tevoren dit moet gebeuren. Nicotinegebruik remt de doorbloeding en daarmee ook de genezing van wonden. Stop daarom minimaal drie weken voor de operatie met roken en houdt dit minimaal een week na de operatie vol.

### De operatie

De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling: u komt 's morgens naar het ziekenhuis en gaat aan het eind van de dag weer naar huis. De operatie duurt ongeveer een uur. Het rechtzetten van de flaporen kan bij volwassenen onder plaatselijke verdoving gebeuren. Bij kinderen gebeurt de operatie onder algehele verdoving (narcose). Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt op een speciale manier omgevouwen en eventueel behandeld met ondiepe insnijdingen. Daarna wordt het met speciale hechtingen vastgezet. Daarna wordt een stukje van de huid aan de achterzijde van het oor verwijderd en wordt de wond gesloten.

### Na de operatie

De eerste dagen na de operatie kunt u pijn hebben. U mag in de week na de operatie geen aspirine, ascal, asprobruis of kinderaspirine gebruiken. Paracetamol kunt u wel gewoon gebruiken. Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenaamde tulband) om uw hoofd heen. Het verband moet een week blijven zitten. U kunt uw haar dan niet wassen. Na een week komt u terug naar de polikliniek voor de eerste controle. Dan verwijdert de KNO-arts de hechtingen en het verband. Als het verband verwijderd is, moet u nog 4-6 weken 's nachts een haarband (tenniszweetband) dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren. Het is verstandig om contactsporten 4-6 weken te vermijden. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog 6-8 weken wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan verdwijnt dit.

### Risico's

Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met de (dienstdoende) KNO-arts:

- Als het verband loslaat
- Bij een nabloeding
- Bij pijn langer dan 2 dagen
- Bij koorts

### Het resultaat

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht blijven staan en geheel symmetrisch blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om een tweede correctie uit te voeren. Door de operatie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de plek meestal niet opvallend.

### Kosten

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten van de flapoorcorrectie niet. Of u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van de ingreep, hangt af van uw zorgverzekeraar en van uw pakket. Neem daarom contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw polis de kosten van de ingreep dekt of dat u het zelf moet betalen.

### Tot slot

Als u overweegt uw oren of de oren van uw kind recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten. Maar een absolute symmetrie van de stand van de oren is vrijwel onmogelijk en onnatuurlijk. Meer informatie over het aanwezig zijn bij het inleiden van de narcose bij kinderen kunt u lezen in de folder over dit onderwerp. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan neemt de KNO-arts ze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

---

[www.mcl.nl](http://www.mcl.nl)

#### **MCL**

Polikliniek KNO  
(ma t/m vrij 8.30 – 16.30 uur)

058 – 286 62 00

#### **MCL Harlingen**

Polikliniek KNO  
(ma, wo, vrij 8.00-16.30 uur, di 8.00-12.00 uur)

0517 – 499 749

Afsprakenbureau  
(ma-vrij 8.00-17.00 uur)

0517 – 499 881