

Sedatie en pijnstilling op de Spoedeisende Hulp (SEH)

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te geven, maar ook een sederend middel. Dit betekent dat u in een lichte slaap valt en daardoor de ingreep prettiger ondergaat.

Wat gaat er gebeuren?

Eerst prikt de verpleegkundige bij u een infuus, zodat de medicijnen via de bloedbaan gegeven kunnen worden. Om u tijdens de ingreep in de gaten te kunnen houden, wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag, ademhaling en zuurstofgehalte meet. Na het toedienen van de medicijnen valt u vrij snel in slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar kunt u zich nog wel wat slaperig voelen. Ook kunt u zich de ingreep vaak niet goed meer herinneren. Dit komt door de medicijnen. Bij het geven van medicijnen voor sedatie is altijd minimaal één ervaren arts en verpleegkundige aanwezig.

Wanneer mag ik naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis als:

- u goed wakker bent,
- uw hartslag en bloeddruk goed zijn,
- u kunt drinken en niet misselijk bent,
- u rechtop kunt zitten en niet duizelig bent.

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis.

Wij adviseren u dat u tot 12 uur na de ingreep geen voertuigen of machines bestuurt.

Wanneer moet ik een arts waarschuwen?

Als u last krijgt van onderstaande klachten belt u dan naar de spoedeisende hulp:

- misselijkheid en/of braken,
- andere klachten die u niet vertrouwt.

Vragen en bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw behandelend arts of bel met de spoedeisende hulp. De afdeling spoedeisende hulp van het MCL is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar via het algemeen nummer van het MCL 058 – 286 66 66.