

## Het onderzoek

Hoe uw onderzoek in zijn werk gaat.

### Pleurapunctie ontlastend

#### *Video voice-over*

*#Pleurapunctie diagnostisch + ontlastend*

*U komt binnen in de onderzoeksruimte, waar een medewerker zal vragen om uw bovenlichaam te ontbloten. Vervolgens mag u plaats nemen op de onderzoeksbank. Afhankelijk van de plek waar het vocht zit, zult u moeten zitten of liggen.*

*Meestal wordt de juiste plek voor de punctie, de prik, bepaald met een echo.*

*Met een koude gel en een glad apparaatje, de echo-kop, wrijft de medewerker over uw huid om het vocht goed in beeld te krijgen.*

*Als de echo klaar is wordt uw huid schoongemaakt met een droge doek en wordt de juiste plek voor de punctie bepaald. Voor u is het belangrijk om stil te blijven zitten of te liggen.*

*De arts zal de punctie-plaats schoonmaken met een vochtig gaasje en verdoven.*

*Deze verdoving kan even zeer doen. Vervolgens zal de arts via een andere naald vocht weg nemen. Het afgenomen vocht kan verschillende kleuren hebben en wordt verder onderzocht in het laboratorium.*

*Als er voldoende vocht is weggenomen haalt de arts de naald uit uw lichaam en wordt het wondje afgeplakt met een pleister. Afhankelijk van de hoeveelheid weggenomen vocht, kunt u last hebben van hoesten. Ook kan het zijn dat u een drukkende of trekkende pijn voelt op uw borst. Meestal verdwijnt dit gevoel vanzelf.*

*Na het onderzoek mag u van de onderzoeksbank af en kunt u zich aankleden.*

*Een ontlastende pleurapunctie kan soms pijnlijk zijn en duurt gewoonlijk zo'n 10 tot 20 minuten.*

Bij een pleurapunctie haalt de arts vocht weg tussen het borstvlies en het longvlies.

Bij sommige mensen produceert het lichaam een te grote hoeveelheid pleuravocht door bijvoorbeeld een ontsteking, hartfalen of een tumor. Hierdoor kan benauwdheid ontstaan. Met een

ontlastende pleurapunctie haalt de arts het vocht weg, waardoor de klachten kunnen afnemen.

Soms wordt vooraf een echo gemaakt om het vocht goed in beeld te brengen en de plaats van de punctie te kunnen bepalen.

---

## Uw voorbereiding

Bereid u voor en houd u aan de onderstaande instructies.



### Bent u zwanger?

Vertel uw arts ruim voor het onderzoek of u zwanger bent of denkt te zijn.



### Autorijden

Een pleurapunctie heeft geen invloed op de rijvaardigheid, maar wij adviseren u niet zelf naar huis te rijden, omdat u zich door de punctie minder fit voelt dan normaal.


---

## Allergieën

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.

### Bent u allergisch voor medicijnen?

Vertel uw arts of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.



---

## Eten en drinken

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



### Eten en drinken

U mag voor het onderzoek gewoon eten en drinken.

---

## Medicijnen

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



### Bloedverdunners

Bespreek uw medicijngebruik met uw longarts.

Als u acenocoumarol of Marcoumar gebruikt, moet u deze waarschijnlijk stoppen. In de meeste gevallen mag u Aspirine en Ascal wel gewoon doorgebruiken. Vertel uw arts welke bloedverdunnende medicijnen u gebruikt.

Bespreek met uw arts wat u moet doen met uw bloedverdunners. Soms moeten de bloedverdunners tijdelijk vervangen worden door andere medicijnen.

---

## Wat neemt u mee?

Bereid u voor door de onderstaande stappen goed door te lezen.



### Neem voor uw ziekenhuisbezoek het volgende mee:

- Uw aanvraagformulier (als u dat heeft gekregen).
- De pas van uw ziektekostenverzekering.
- Een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, rijbewijs, paspoort).
- Een lijstje met de medicijnen die u gebruikt. Dit wordt in sommige ziekenhuizen ook wel een AMO (Actueel Medicatie Overzicht) genoemd.



### Heeft u nog vragen over dit onderzoek?

Stel uw vragen vóór het onderzoek aan uw arts of zorgverlener of neem vóór het onderzoek contact op met uw arts.

---

## Nazorg na uw onderzoek



### De uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek zal door uw eigen arts met u worden besproken.

**Een half uur rust**



Het is verstandig om na het onderzoek een half uur rust te nemen. U mag wel rondlopen tenzij de arts anders met u bespreekt.



## Aanvullend onderzoek

Het kan zijn dat de arts na het onderzoek nog een röntgenonderzoek van de longen wil laten doen. Dat kan nodig zijn om het effect van de punctie te beoordelen.



## Autorijden

Een pleurapunctie heeft geen invloed op de rijvaardigheid, maar wij adviseren u niet zelf naar huis te rijden, omdat u zich door de punctie minder fit voelt dan normaal.

---

# Mogelijke complicaties

Informatie over mogelijke complicaties na uw onderzoek of therapie



## Mogelijke complicaties

Complicaties komen niet vaak voor, maar de volgende complicaties kunnen optreden:

### Een draaiërig gevoel

Het kan zijn dat u een draaiërig gevoel ervaart tijdens het onderzoek.

### Benauwdheid of een trekkend gevoel op de borst

Dit verdwijnt normaal gesproken binnen enkele dagen.

Voelt u zich na de punctie steeds meer benauwd, waarschuw dan direct de verpleegkundige. Wanneer u thuis bent waarschuw dan uw huisarts, of neem contact op met de longarts.

### Pijnlijke punctieplaats

De punctieplaats kan nog een tijdje pijnlijk aanvoelen, alsof u een 'blauwe plek' heeft.

**Een klaplong**

Een enkele keer kan er een klaplong ontstaan na een punctie. Meestal geeft dit klachten van hoesten, pijn of kortademigheid.

**Een bloeding in de borstkas**

Dit komt maar zeer zelden voor.